

INHALTSVERZEICHNIS

1. Derma-KOLLO-gie	1
1.1. Merk	1
1.2. Leberhautzeichen	1
1.3. Bowen	1
1.4. Effloreszenzen	1
1.5. DD	1

1. DERMA-KOLLO-GIE

1.1. Merk.

- Filaggrin-Defekt macht Haut durchlässiger, daher mehr Durchtritt & Sensibilisierung - Asthma und so alles Folgen davon
- Filaggrin in der Lunge selbst nicht vorhanden, nur in der Haut
- TEN: Allopurinol-Rektion mit Blasen überall und so (über 30% Hautoberfläche) = Stevens-Johnson (unter 10% Hautoberfläche)
- DRESS: langsamer, entsteht über eine Woche, dann Verselbstständigung vom reizenden Agens = Lyell. Leber mit betroffen.
- Ganzjährige Beschwerden: Hausstaubmilbe :-)
- Treg; Je mehr Agens, desto wahrscheinlicher ist eine Toleranzentwicklung
- Akne-Rosacea: R ohne Komedonen
- Merk: Caesar heißt ..der glatzköpfige..
- narbige Alopezie: Haarboden defekt

1.2. Leberhautzeichen.

- Spidernävus: Arterielle Gefäßneubildung, Abflussgebiet der Cava superior

- Gynäkomastie & Hodenatroph wegen geringeren Ö-Abbau in der Leber
- Purpura oft durch Mangel an Gerinnungsfaktoren
- Ikterus: Bilirubin
- Juckreiz: Enzymwirkung von Enzymen die nicht abgebaut werden

1.3. Bowen.

- M Bowen und aktinische Keratose beide präkanzerotisch (in Situ)
- Aktinisch: UV-Expo mit DNA-Defekt
- M Bowen aggressiver - meistens HPV da
- Unterscheidung Histologisch, Bowen: Atypische in allen Schichten = Monsterzellen, Actinische: nur Str. spinosum und basale

1.4. Effloreszenzen.

- Macula: Fleck
- Papel unter 5mm
- Nodus über 5mm
- Urtikae = Quaddeln
- Vesiculae gefüllt & in der Epidermis
- größere: Bullae
- epidermale: schlaff, instabil, keine Narben, intradermale: straff
- Schuppung entweder groblaminär oder feinlaminär, normale die man so kennt ist immer feinlaminär
- Keloid: Überschießende Narbe, also nicht nur hypertroph
- Lichenifikation = Vergröberung
- Purpura = Petechen, nicht wegdrückbar mit Glasspatel
- Kokarde: Schießscheibenartig

1.5. DD.

- Atopisch: Kniekehle, innenseite Ellenbogen
- Psoriasis: Außenseiten, Hintern, Haaransatz