

21. August 2012

## INHALTSVERZEICHNIS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. GynäKOLLOgie           | 1 |
| 1.1. Zerixkarzinomtest    | 1 |
| 1.2. Ovarial-Karzinom     | 1 |
| 1.3. Becher und Schüsseln | 1 |
| 1.4. Verhütung            | 1 |

## 1. GYNÄKOLLOGIE

leider 90 Minuten verpasst wegen vergessen

### 1.1. Zerixkarzinomtest.

- es wird sowohl Essig- als auch Jod-Probe gemacht → Gewebe verfärbt sich wenn entartet
- PAP-Abstrich regelmäßig zur Vorsorge
- HPV-Impfung super

### 1.2. Ovarial-Karzinom.

- macht lange keine Symptome
- Beschwerden Verstopfung, Bauchschmerz, unspezifisch
- Auch: Postmenopausen-Blutung bei 20%
- Pille schützt sehr: 50% weniger Ovarial-CA und Endometrium-CA
- Therapie: OP immer plus

### 1.3. Becher und Schüsseln.

- Hauptgefäß: A uterina, erster Ast, danach Vaginalarterien

- ein Ast der A uterina geht hoch bis zum Ovar und anastomosiert mit der A ovarica
- alles aus der iliaca interna

### 1.4. Verhütung. wird Prüfungsfrage sein irgendwie anscheinend

- Ring und Pille nicht ganz so sicher wie Spirale oder Cutanstab
- stillen schützt auch vor Schwangerschaft
- gute Kotrazeptiva haben nullkomma irgendwas im Perl
- Im Nuvaring ist Öst & Gest drinnen
- Resorption der Pille zwischen 40-80% je nach Frau
- es muss immer die doppelte Ovulationshemmdosis drinnen sein (LH-Mechanismus, Peak wird unterdrückt)
- Micropille hat mehr (!) Gestagen als die Minipille
- normal 21d mit und 8d ohne Pille
- wenn man die Pillenpause verkürzt wird die Pille sicherer → verlängerte Pillenpause: Gefährlich
- wenn man die Pille durchnimmt ist man immer noch ziemlich sicher, wenn man sie mal vergisst einen Tag
- Grund für die Pillenpause: Akzeptanz der Pille als solches höher, wenn es eine Blutung und einen Zyklus gibt – Medizinisch gibt es keinen Grund für die Pillenpause, auch gibt es nicht mehr Komplikationen o.ä.
- Gewichtsveränderungen unter Pille nicht anders als sonst im Zyklus → 2 Kilo durchaus möglich
- Zwischenblutung beim Pillenbeginn 3 Zyklen oder so ganz normal
- Pille bei Diabetes nicht erlaubt!
- Migräne kann verstärkt werden