

9. November 2013

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Psychatrie 5 - EKT
- 1.1. allgemeines

1
1

1. PSYCHATRIE 5 - EKT

20 min am Anfang verpasst

1.1. **allgemeines.**

- EKT gegen Patientenwillen sehr selten
- kurznarkose mit Larynxmaske
- oft macht es Sinn eine EKT über ein halbes Jahr oder so zu machen, abstand z.B. dann 2-3 Wochen
- Elektroden werden vorzugsweise einseitig geklebt

- es wird eine Präoxygenierung durchgeführt, sinnvoll bei einem Krampf
- EEG monitoring
- Maximal 100x in der Lebenszeit
- bei Affektivem und Wahl hilft es gut
- Succinyl auch wichtig zum Muskel entspannen → Muskelschutz
- Blutsperre am Fuß über Systolischem RR → Succy kommt nicht an und der Fuß zuckt
- 50-90% der therapierefraktären werden deutlich besser
- besonders wenn schnell eine EKT gemacht wird – am besten nach 2 ..herkömmlichen.. Kuren
- NW: retrograde Gedächtnisstörungen
- Depression als Komponente einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung z.B.: nicht sinnvoll
- 15%: Insel-Gedächtnisstörungen
- nach der EKT dennoch immer neuropsychiatrisch besser