

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Innere II - Untersuchungs-Vorlesung
1.1.	allgemeines
1.2.	Inpektion
1.3.	Leberhautzeichen
1.4.	Auskultatio
1.5.	Palpation
1.6.	Perku
1.7.	Rektum
1.8.	Appendizitis
1.9.	Cholezystitis
1.10.	Ileus
1.11.	Pankreatitis
1.12.	Magensonde

## 1. INNERE II - UNTERSUCHUNGS-VORLESUNG

Tacke

### 1.1. **allgemeines.**

- erst abhören und dann abtasten
- rektale Untersuchung gehört zu vollständigem Programm

### 1.2. **Inpektion.**

- Spider nävi: teleangiektasien - wegdrückbar → Leberhautzeichen
- Narben z.B. Sternotomie, Gallenblase, Bauchschnitt, Blinddarm, Kaiser, Leistenhernie, Blase
- gute Folie vorhanden
- aufgetriebenes Abdomen:
  - Aszites
  - Speck
  - Schwangerschaft
- 5 F: Fett, Flüssigkeit, Fötus, Fäzes, Flatus

### 1.3. **Leberhautzeichen.**

1	• Ikterus
1	• Caput medusae
1	• Lackzunge
1	• Spider nävi
1	• Bauchglatze
1	• Gynäkomastie (beides wegen niedrigem Testosteron bei Leberschaden)
1	• Kratzspuren

### 1.4. **Auskultatio.**

- |   |   |
|---|---|
| 2 | • Stille: Paralytischer Ileus                                   |
| 2 | • Metall: Ileus (hohe töne)                                     |
| 2 | • viel Zeit geben - eigentlich 2 Minuten warten auf Peristaltik |
| 2 | • Bauchaorta: bei schlanken zu hören                            |
| 2 | • Nierenarterienstenose: manchmal Strömungsgeräusch             |

### 1.5. **Palpation.**

- da anfangen, wo der Patient keine Schmerzen hat - Grundspannung-check als Eichung
- epigastrischer Druckschmerz: typisch für Gastritis
- Leber: unten eindrücken und bei Einatmung auf Leberunterkante warten
- normalgroße Leber ist ertastbar mit Erfahrung
- die Milz zu tasten ist nur bei pathol. Veränderungen möglich
- Gallenblase: Hand unter dem Rippenbogen - Murphy-Zeichen = Patient stoppt die Einatmung bei Erreichen der schmerzhaften Gallenblase
- Curvosier-Zeichen unschmerzhaftes Gallenblase ist tastbar, gerne bei Pank-Kopf-Karzinom

### 1.6. **Perku.**

- Luft, Aszites nach Ton
- Druckwelle beim Aszites

### 1.7. **Rektum.**

- Prolaps
- Marissen
- gute Folie
- gleich Häemocult machen vom Fingerling
- Schließmuskel und Rektalkarzinome z.B. gut tastbar

### 1.8. **Appendizitis.**

- gerne Schmerzbeginn beim Nabel, dann Wanderung
- McBurney: Mitte zw. Bauchnabel und SpIIISupAnt
- Lanz: 1. drittel zw den SpII
- Loslsschmerz: gegenseite - mind 30. Sekunden festhalten vor loslassen = Blumberg-Zeichen
- Psoas-Schmerz - so benachbart, daß Bein anwinkeln schmerzen kann
- auch gut: Darm gegen die Transportrichtung ausstreichen: Schmerz = Rovsing-Zeichen

### 1.9. **Cholezystitis.**

- Murphy-Zeichen positiv

### 1.10. **Ileus.**

- akustische Zeichen
- ubiquitärer Druckschmerz
- Bauchhärte fehlt oft bei Alten Menschen = Peritonismus

### 1.11. **Pankreatitis.**

- Gummibauch

### 1.12. **Magensonde.**

- z.B. für TBC-Diag
- sonst alle gewöhnlichen Indikationen
- 2h Nahrungskadenz
- Komplikation wie bei Spiegelung: Bradykardie
- am besten: sitzen und schlucken lassen (trinken aus Strohhalm)
- Lagekontrolle: Blasenspritze und es blubbert