

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Chir II - Magen & Duodenum	1
1.1.	Magen	1
1.2.	Punk	1
1.3.	Schmerzsorten	1
1.4.	Magensonde	1
1.5.	Passage	1
1.6.	Untersuchungen	1
1.7.	Fremdkörper	1
1.8.	Pylorusfehlbildung	1
1.9.	Magenverletzungen	2
1.10.	Blutung	2
1.11.	Billroth	2
1.12.	Magentumore	2
1.13.	Magenverkleinerung	2

## 1. CHIR II - MAGEN & DUODENUM

Konze

### 1.1. Magen.

- Submucosa braucht man zum nähen
- im Muskel wird das gleich nekrotisch und schlaff
- Magenarkaden sind wichtig - beim Magenhochzug (Ö-Entfernungen) wird die große Kurvatur hinaufgezogen
- Magen dankbar - heilt gut wegen der guten Durchblutung
- Lymphknoten liegen Gefäßnah

### 1.2. Punk.

- Pankreas ist die Königsklasse der OP, die Enzyme verdauen alles

### 1.3. Schmerzsorten.

- Fröhschmerz: unter 1h nach essen - ulcer im oberen Magendrittel
- Spätschmerz 1-3h postprandial - Ulcus

- Nüchernschmerz - nachts, Essen hilft: Ulcus duodeni
- Dauerschmerz im Extremfall
- Virchow-Drüse: Supraclaviculär links zeichen von Magen-Metastase

### 1.4. Magensonde.

- 1. Widerstand: Gaumensegel = Halbzeit
- langsam machen
- zuerst erklären - Kehldeckel und so

### 1.5. Passage.

- Gastrografin: Bester Rohrdurchputzer überhaupt
- Barium gefährlich wenn es eine Perforation gibt

### 1.6. Untersuchungen.

- pH-Langzeituntersuchung
- Manometrie → check der Peristaltik

### 1.7. Fremdkörper.

- gerne in Gefängnissen: Löffelstiel wird gegessen → Urlaub auf der Krankenstation
- 60-80% passieren spontan

### 1.8. Pylorusfehlbildung.

- bei Kindern, behalten Essen nicht bei sich
- OP: Spaltung der Muskelschicht von außen

### 1.9. Magenverletzungen.

- oft: Fehlintonation
- Messer und Kugeln selten
- Verätzungen durch Laugen und so sind übel
- Duodenal-Reflux schadet der Magenschleimhaut
- Alkohol selbst schadet auch der Schleimhaut
- jedes Ulcus muss biopsiert werden
- Chir-Buch-Bibel: Schumpelig oder Schrumpelig oder so

**1.10. Blutung.**

- Klassifikation nach Forrest
- I-II
- frisch bis alt

**1.11. Billroth.**

- super Chirurg
- hat viel Magen aufgeschrieben
- Billroth-II ist fast wie eine Whipple

**1.12. Magentumore.**

- intestinal = positiv = gut
- diffus = infiltrativ = schlecht
- einteilung nach Laurén irgendwie
- Lymphogene Metastasen: Omentum
- Zentrale Einziehung typisch

**1.13. Magenverkleinerung.**

- bei dicken halt
- magenband früher mit Port
- heute macht man eher einen Magenbypass