

INHALTSVERZEICHNIS

1. Gauggel iX - ADHS-Diagnostik	1
1.1. allgemein	1
1.2. Kernsymptome	1

1. GAUGGEL iX - ADHS-DIAGNOSTIK

1.1. **allgemein.**

- bei Erwachsenen nur, wenn sie das als Kind schon hatten
- Pharmakotherapie bei manchen Kindern essentiell
- 50% noch im Erwachsenenleben nachweisbar
- vor 5.-7. Lebensjahr muss es da sein
- normalerweise zusammen mit weiteren psychischen oder körperlichen Störungen
- Typisch: Lese-Rechtschreibstörungen oder Störungen des Sozialverhaltens
- Hoffmann: Struwwelpeter
- Stimulantienbehandlung: Wirkungsvoll

- ICD-10 F90x und F98x
- ein Typ auch: Verträumt - besonders Mädels
- Überforderung: Kann nicht folgen → Klassenclown → keine Aufmerksamkeit → Fehldiagnose
- Störung des Sozialverhaltens: Gewalt, Tierquälerei, Diebstahl, Polizeikontakt

1.2. **Kernsymptome.**

- Impulsivität
- Ablenkbarkeit
- Unruhe
- Folien mit Checklisten
- Unfallhäufigkeit hoch
- Gute Folie wann Symptome da sind und wann nicht
- Hyperaktivität kommt mitunter als Hochbegabung rüber
- Kindergarten & Vorschulalter: Geringe Spielintensität und -ausdauer
- oppositionelles Verhalten
- Risikofaktor: Negativ-kontrollierender Erziehungsstil
- Unaufmerksamkeitstyp: Buben/Mädel 1:1
- SITUATIONSÜBERGREIFEND = perversiv